

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

AUVERGNE ET LIMOUSIN

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Cité Administrative, rue Pélissier

63034 Clermont Ferrand Cedex

☎ (73) 92-42-68

BULLETIN TECHNIQUE
PUBLICATION PERIODIQUE

Edition générale

Le 16 Mai 1983

N° 14

BLE

* Situation

Les premiers foyers de Rouille Jaune sont signalés.

Cette maladie a été décelée à ST PRIEST (63) sur variété FIDEL et à CHARBONNIER (63) sur variété TOP.

* Préconisations

Il est indispensable de bien surveiller vos cultures.

Une intervention sera nécessaire dès l'observation du 1er foyer.

Cette maladie ayant un développement épidémique, il faut être très *vigilant* particulièrement pour les *variétés sensibles* comme : FIDEL, TALENT, TOP, CAMP-REMY, LUTIN, COURTOT...

Utiliser un *longicide performant* pour combattre cette maladie, (consulter le tableau paru dans notre Bulletin n° 8). Les *préconisations* de notre Bulletin précédent demeurent toujours valables pour ce qui concerne les autres maladies du feuillage.

COLZA

Stade

- à
- G 2 : Les 10 premières siliques mesurent 2 à 4 cm.
 - G 4 : Les 10 premières siliques sont bosselées.

CHARANÇON DES SILIQUES

Maintenir la surveillance jusqu'au stade G 4. Les captures sont toujours faibles dans notre réseau de piégeage.

N. B. : Rajouter au Bulletin n° 8 - Tableau des produits utilisables :
deltaméthrine : 5 g (DECIS 0,2 l/ha) qui vient d'obtenir une autorisation de vente.

P 257 .../...

DIRECTEUR-GERANT: B. MORIN

N° de série: 302

Numéro d'inscription à
la C.C.P. : 525 A DRégie de Recettes de la D.D.A.
C.C.P. Clermont-Ferrand 5 503.17ABONNEMENT
ANNUEL: 100 F

Quelques colonies sont signalées. Les conditions climatiques actuelles sont défavorables au développement de ces insectes.

Il est rappelé que le seuil d'intervention est de 2 colonies/m².

Un traitement de bordure est le plus souvent suffisant. Utiliser, si nécessaire, l'un des produits suivants (non dangereux pour les abeilles) :

- Pirimicarbe - PIRIMOR
- Bromophos - SOVI-NEXION
- Endosulfan + Thiométon - SERK

ALTERNARIA

Aucun symptôme sur silique n'est encore observé. *Il est inutile d'intervenir pour l'instant.*

ARBRES FRUITIERS A PEPINS

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

Les premières taches de Tavelure ont été observées sur feuilles de pommier et sur feuilles et jeunes fruits de poirier le 13 Mai.

Avec la période humide actuelle, de nouvelles contaminations primaires peuvent se produire, les projections d'ascospores se poursuivant tant au laboratoire que dans la nature.

Maintenir une protection soigneuse en tous secteurs.

OIDIUM

Ajouter à la bouillie anti-tavelure un produit anti-oidium. Les conditions climatiques actuelles sont favorables au développement de cette maladie.

ACARIENS ROUGES

Les éclosions des oeufs d'hiver atteignent 80 à 90 %. Dans les vergers contaminés en 1982, où de nombreuses pontes ont été déposées (observées lors de la taille), il est recommandé de s'assurer de la présence des formes mobiles sur les feuilles.

Le seuil de traitement est de 4 à 5 formes mobiles sur les feuilles de la base des pousses de l'année.

Si ce seuil d'intervention est atteint, effectuer un traitement dès les prochains jours.

PUCERONS - CHENILLES

Un développement important de ces parasites, notamment pucerons a été noté ces derniers jours.

Intervenir si nécessaire.

VIGNE

MILDIOU

Les conditions climatiques actuelles sont favorables à l'évolution de la maladie.

La vigne est à un stade sensible (F-G), en conséquence, il convient d'être vigilant.

Les premières contaminations ont pu se produire à la suite des pluies du 6 Mai. Les premières taches peuvent apparaître dans les prochains jours. Afin de protéger les grappes, une intervention est recommandée avant la fin de cette semaine.

Pour le choix des produits, consulter le Bulletin n° 12 du 4 Mai 1983.